AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

ABONNEMENT ANNUEL

Tél. 34-14-63 - Poste 93 (BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

-15 F.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

29 Mai 1964.

Supplément nº 2 du Bulletin du mois de Mai 1964.

VIGNE

/Avertissement/

MILDIOU

A la suite des pluies localisées survenues en différents points du vignoble, des infections primaires ont pu se produire et des taches devraient apparaître isolément dans le courant de la semaine prochaine.

David le cas de la présence de regonyle

Dans ces régions, qu'il est difficile de préciser avec exactitude, compte tenu du caractère orageux des précipitations, il sera nécessaire d'exécuter une première application fongicide dans la période du 1 au 3 Juin.

On choisira l'un des produits figurant sur la liste en votre possession.

COCHYLIS - EUDEMIS

Les vols de papillons de ces Tordeuses, se manifestent avec une assez faible intensité selon les secteurs. Des pontes ont été observées et les premières chenilles pourront apparaître d'ici quelques jours.

On profitera de l'application fongicide conseillée contre le Mildiou pour exécuter un traitement mixte.

/Information/

OIDIUM

L'addition d'un Soufre mouillable à la bouillie précédente est recommandée.

.../...

187

GRANDE CULTURE

BETTERAVES SUCRIERES

PUCERONS NOIRS

1208 48-0-5-910

L'installation des Pucerons sur betteraves sucrières est notée dans la plupart des cultures et l'exécution d'un traitement insecticide devrait être réalisée partout où l'on peut observer la présence de petites colonies sur une proportion élevée de feuilles : 3 à 5 petites colonies de 5 à 10 Pucerons sur une dizaine de feuilles par exemple.

MICHAEL STREET WORLD AND A VOSCIES

Utiliser un produit efficace contre les Pucerons en se rapportant à la liste des produits conseillés.

Dans le cas de la présence de Pégomyie, choisir de préférence un produit efficace contre les deux parasites.

an range of the imputed of this $\frac{C + O + U + X}{C + O + U + X}$ and say althought of the larger

pave tretacilinam es , sospetio" una en ancillost et siev tel

windbesty willied at a blostinom evisor nut a apptible to

une asset fulble integral to select esched les soles ont est observant soles cont est observant soles product de serve de la s

PUCERON CENDRE

F F 15 F F

En raison de l'important développement de cette espèce sur Choux, effectuer une application aphicide, en respectant la législation en vigueur. Il est nécessaire d'ajouter un mouillant.

Les Contrôleurs :

J. BERNARD et C. GACHON.

1'Inspecteur :
J. HARRANGER

- La renoment des

Imprimerie de la Station de STRASBOURG/ Directeur-Gérant : L. BOUYX.